

FORMATION

ETABLISSEMENTS AGRÉES

CHIENS: DEVELOPPEMENT COMORTEMENTAL,

ELEVAGE ET HYPERTYPE, AGRESSIVITÉ CANINE

Notes de cours préparées par Claire DIEDERICH

10 SEPTEMBRE 2025 (4H30)





PROGRAMME:

Mercredi 03/09/2025: Partie commune: Principes généraux (4h30)

Mercredi 10/09 : **Développement comportemental, sélection, chiens mordeurs** (13h-17h30)

13h-14h30: Développement comportemental

14h30-14h45: Pause

14h45-16h15: Elevage, Maladies génétiques

16h15-16h30: Pause + café

16h30-17h30: Agressivité canine

Jeudi 04/12 : Hygiène et infrastructures (8h-12h30)

DÉVELOPPEMENT COMPORTEMENTAL

Grands systèmes comportementaux, comportement néonatal



GESTATION, MISE-BAS ET COMPORTEMENT MATERNEL

- **Durée de la gestation** : 57 à 72 Jours
- **Portées** : max. 2 /an
 - Nombre de chiots : de 1 à ... 15 !
 - Mise-bas dans un '**nid**' (endroit calme, sec et sombre)
- **Soins aux jeunes** = Léchage intense, au moment de l'expulsion
 - installation du lien mère-chiot
 - stimulation respiratoire (massage)
 - séchage du pelage du chiot
 - + défense du jeune
 - + section des enveloppes foétales et du cordon ombilical
 - + ingestion des enveloppes foétales
- Diminution progressive, en 5 semaines, de la présence de la mère près des chiots



- **Allaitement et sevrage**

* S1-S3: 100% lacté,

réflexe de fouissement présent j → 11J

croissance rapide (poids X2 après S1, X3 après S2)

*S4 à S7:

éruption des dents de lait (21 J)

passage progressif à une alimentation solide (de S4 à S7)

- * allaitement debout par la mère
- * refus d'allaitement (repousse du museau ou grogne)
- * dents de lait présentes et blessent les mamelles
- * le chiot lape de l'eau et du lait (à p. S3-S4)
- * régurgitations d'aliments partiellement digérés par la mère



DÉVELOPPEMENT COMPORTEMENTAL DES CHIOTS

Vidéo 43 min.

Espèce immature à la naissance

- organes des sens pas complètement fonctionnels à la naissance.
→ Attendre 3 semaines
- déplacements très limités (ramper)
→ Ressemble à celle de l'adulte à 7 semaines
- pas de thermorégulation avant la 7^e semaine (orientation vers le chaud)
- comportement éliminatoire (urine-mat. fécales) déclenché par la mère pendant les 2 premières semaines



4 périodes dans le **développement comportemental** :

1. néonatale : semaines 1 et 2 (interactions chiots-mères +++)
 - organes des sens non fonctionnels
 - locomotion limitée (rampe, réflexe de fouissement)
2. de transition : semaine 3 (interactions chiots-chiots +++)
 - organes des sens et comportement éliminatoire fonctionnels
 - début des mordillements et de la mastication
 - sortie du nid
3. de socialisation : semaines 4 à 14 (12 à 16)
 - découverte de l'environnement: perception / interactions
 - attraction suivie d'aversion (évolution dans le temps)
 - apprentissages nombreux !
4. juvénile : > 12 semaines jusqu'à l'âge adulte (= maturité sexuelle chez les animaux)



Concept d'attachement à la mère

- observé chez l'homme, les primates, les ongulés
- PAS en inter-spécifique
- Hyper-attachement d'un chien à l'homme ???

Apprentissages nombreux

- Socialisation : Appartenance à l'espèce canine par exposition et expérimentation des modalités de communication
 - contacts/ jeux avec des chiens adultes et d'autres chiots
 - apprentissage du contrôle de la morsure
- Familiarisation aux autres espèces, dont l'homme
 - contacts dans des contextes positifs
- Habituation à l'environnement non-vivant
 - bruits, lieux divers, espèces diverses
 - permettre les cachettes et la fuite, si stimulus trop impressionnant

ELEVAGE

MALADIES GÉNÉTIQUES

Bien-être et Hypertypes



bruxelles
environnement
.brussels 



DOMESTICATION, RACES CANINES

- **Epoque:** 10.000 à 13.000 ans avant JC (d'après les vestiges fossiles)
env. -35.000 ans (d'après des analyses génétiques séparation chien-loup)
- **Lieu(x):** à plusieurs endroits en même temps (Europe centrale, Italie, Israël, Chine)
Vestiges les + anciens de canidés à Oberkassel, près de Bonn (Allemagne)

Raisons de la domestication :

multiples, toujours en discussion, avant que l'homme ne devienne sédentaire

Utilitaires

- chasse en collaboration avec l'homme
(coopération de 2 prédateurs)
- accès et évacuation des déchets, garde du camp

Non-utilitaires

- animal de compagnie, ensuite pour la chasse



- **Ancêtre unique: le loup gris (Canis lupus) → Canis familiaris**

(il n'y a que 0.2% de différence entre les ADN mitochondriaux)

- **Statut actuel**

Animal de compagnie avec variations individuelles (traits de tempérament: jeu, curiosité, poursuivre, sociabilité, agressivité (Svartberg & Forkman, 2002))

et très peu de chiens de travail (chiens d'aide, d'utilité, de protection, de chasse...)

Population en Belgique: env. 2,5 millions de chiens enregistrés (DogId, à jour ?)

Sélection et création des races:

- dès l'époque romaine, pour le travail (garde, troupeau, ...°
- au Moyen Age, surtout pour la chasse
- au XIX^ès., avec la naissance de la cynophilie officielle et la première exposition canine à Londres (1860)

La FCI décrit le standard de 380 races de chiens / 800 possibles



DIFFÉRENCES ENTRE ÉLEVAGES CANINS EN BELGIQUE

Etude sur les caractéristiques des élevages canins en Belgique

Pupwelfare

par PA Dendoncker et coordonnée par UGand, UNamur et Ulg (2014-18)

4 types d'éleveurs (cfr législation belge)

→ 4 catégories, selon les observations de terrain

(nombre de chiennes reproductrices et de chiots vendus par an)

Caractéristiques étudiées:

- milieu de vie des chiots stimulant leur développement,
- sélection des personnes à qui les chiots sont vendus,
- gestion de la santé des animaux (prévention: vaccins, vermifuges),
- mise en place de mesures de bio-sécurité (hygiène des locaux et du matériel),
- contrôle des stimuli (aversifs)



ELEVAGE ET MALADIES GÉNÉTIQUES

Etre un éleveur responsable implique de

- S'informer sur l'existence d'éventuelles maladies génétiques dans la race élevée
Rechercher la présence/le portage génétique de ces maladies au sein de son élevage (test ou dépistage génétique)

Ex: <https://www.antagene.com/fr/solutions/antagene-selection-bis-0>

- Se questionner sur la pertinence d'élever des animaux à phénotype (à terme) douloureux

Ex: Cavalier King Charles et endocardiose mitrale → souffle cardiaque jusqu'à insuffisance cardiaque

- Hypertype : lecture erronée des pédigrées.


Réviser son jugement et celui des juges



Prévenez l'apparition d'une maladie génétique

- Maîtrisez la santé de votre production

Dépistez précocement vos reproducteurs et produisez des chiots/chatons indemnes d'une maladie génétique



- > Vous sélectionnez des reproducteurs sains ou porteurs sains
- > Adaptez vos mariages
- > Produisez des chiots chatons qui ne développeront pas la maladie

Sécurisez votre élevage en maîtrisant vos saillies

- Votre élevage est indemne d'une maladie génétique, ne laissez pas un reproducteur non testé s'introduire



- > Exigez des reproducteurs testés
- > Sélectionnez un reproducteur indemne
- > Protégez votre élevage des maladies génétiques



Qu'est-ce que la Beauté ?

- Notion complexe et abstraite
- Sensation de plaisir/satisfaction
- Varie d'une fois à l'autre
Varie d'un individu à l'autre

Qu'est-ce qui est beau ?


Qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Standard de race

« La face devrait être
aussi courte que possible »
Standard en 1876

« La face devrait être
assez courte »
Standard en 2011

**Une description des caractéristiques
d'un individu hypothétique ou idéal
appartenant à cette race**



Interprétation



Illustration de BUFFON
(1839)

Illustration du standard du Bull-dogue
Anglais (2011), FCI



Standard

≠ Signes physiques
extrêmes



Variabilité
intra-population



A l'initiative du Conseil W. du BEA
+ à la demande de la Min. du BEA-W:

- identifier les phénotypes délétères susceptibles de porter atteinte au BEA
- suggérer des solutions pour garantir le BEA

Les diapositives suivantes rapportent la synthèse de ces travaux tenus de 02-2021 à 04-2023
(avis du Conseil : [Avis_hypertype_chiens_05062023.pdf](#))



PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

- **Convention STE 125 du 13/11/1987** : Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie , ratifiée par la Belgique, entrée en vigueur le 01/07/1992

En application de l'article 15 de cette Convention, un comité d'experts du Conseil de l'Europe s'est réuni en 1995 et a élaboré et adopté une résolution sur l'élevage des animaux de compagnie, comportant des recommandations destinées principalement aux juges et éleveurs de chiens et visant explicitement à lutter contre les hypertypes.

- **Arrêté royal du 27 avril 2007** : Conditions d'agrément des établissements pour animaux et de commercialisation des animaux

avec des normes de détention pour les chiens et les chats dans les élevages



PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

- **Conseil de l'Europe du 16 décembre 2019:** Conclusions sur le bien-être animal

Nécessité d'actualiser la législation en vigueur, notamment dans le domaine du bien-être des chiens et des chats détenus dans le cadre d'une activité économique afin de l'adapter en fonction des connaissances scientifiques les plus récentes et de l'évolution technique.

- **Parlement Européen → Projet de législation (19-06-2025)**

- Identification et enregistrement obligatoires de tous les chiens et chats détenus dans l'UE
- Interdiction de vendre des chiens et des chats dans les animaleries
- Enregistrement des chiens et chats importés à des fins commerciales ou non commerciales



CADRE SCIENTIFIQUE

- Maladie génétique
 - monogénique, polygénique et multifactorielle. Ex. dysplasie hanche
- Consanguinité et dépression liée à la consanguinité
 - diminution de la fertilité et des performances, apparition de tares, augmentation du 'fardeau génétique'
- Race canine
- Hypertype



Hypertype = toute déviance sélective à partir d'un type racial idéal

-concernant soit la conformation du chien dans son ensemble,
soit un élément de celle-ci,

-se traduisant par une expressivité extrême, voire excessive, de particularités inscrites au
standard de la race considérée

Les principales catégories d'affections pathologiques graves ainsi favorisées :

- affections respiratoires
- locomotrices
- cutanées
- oculaires



SPECIAL OBSERVATION LISTS OF DOG BREEDS

2014 : Breed Specific Instructions (BSI) édité par le Nordic Kennel Union

Ce document résulte de la collaboration étendue entre les juges d'exposition canine, les clubs d'élevage, les vétérinaires et les statistiques de l'assurance maladie pour carnivores domestiques de 5 pays nordiques.



LISTES DE RACES À RISQUE ?

2014 : Breed Specific Instructions (BSI) édité par le Nordic Kennel Union

Ce document résulte de la collaboration étendue entre les juges d'exposition canine, les clubs d'élevage, les vétérinaires et les statistiques de l'assurance maladie pour carnivores domestiques de 5 pays nordiques,

2016 : Breed specific instructions éditées par le Dutch Kennel Club.,

éd. Committee of the Association "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" (Dutch Kennel Club) after consultation and in cooperation with the "Dutch Dog Show Judges" Association (VKK) and the Dutch Breed Clubs

En France, Guintard et Class proposent une liste des facteurs de risque à surveiller pouvant aboutir à l'hypertype dans les races (2017)

Bull. Acad. Vét. France — 2017 - Tome 170 - N°5, page 245 à 248



Sites web: [Genodog](#), [Omia](#) (certaines maladies très rares)

Livres

Outils génétiques d'identification

Sélection des géniteurs et risques liés à celle-ci

Conseil génétique = Programme d'accouplement dirigés pour identifier les animaux à accoupler sans augmenter la consanguinité, diminuer la fréquence des tares tout en améliorant les 'performances' des descendants

Éliminer les animaux porteurs (sains et malades) =



consanguinité et apparition potentielle d'autres tares



ACTEURS DE LUTTE CONTRE LES HYPERTYPES

La FIC (Standards et hypertypes)

Les juges (Sélection et jugement du chien)

La SRSB (Pedigree et hypertype)

Les éleveurs (mode de sélection)

La protection animale

Les vétérinaires



QUELLES SOLUTIONS PROPOSER ?

DISCUSSION EN GT

Votre avis : leviers pour lutter contre les hypertypes ? (d'après Guintard & Class, 2017)

- Standards de race ?
- Information et formation des juges, éleveurs et autres acteurs de la filière ?
- Promouvoir les bons éleveurs, proposer un label, faire la promotion du 'normo-type' ?
- Faire des tests avant la mise à la reproduction (par les vétérinaires) ?
- Assurer un système de remontée des informations aux responsables des Clubs de races, aux vétérinaires, aux acteurs de la filière ?
- Sensibiliser le grand public et les médias des conséquences des hypertypes ?
- Légiférer : interdire, obliger à ... ?



Priorité à l'analyse des hypertypes (N=30) ayant un impact sévère pour une (des) race(s) très représentée(s) en région wallonne:

Brachycéphalie

Nanisme/gigantisme

Problèmes locomoteurs :

Dysplasie hanche

Pb. ostéo-artic.

Couleur de robe/yeux

Comportement du Border Collie et du Malinois



Liste des Hypertypes (protection animale au sein du GT)

Caractéristiques extrêmes	Plan de travail du GT
HT 1 Museau court	Brachy
HT10 Teacup/Toy/Miniature/Nains	Nanisme
HT2 Inclinaison du dos	Problèmes locomoteurs
HT9 Les dimensions du squelette (tête, colonne vertébrale, jambes courtes)	Problèmes locomoteurs
HT11 Queue courte	Problèmes locomoteurs
HT3 Dysplasie ectodermique (absence de poils)	Problématiques liées à la robe et aux yeux
HT4 Excès de peau (plis/rides),	Problématiques liées à la robe et aux yeux
HT5 Syndrome merle	Problématiques liées à la robe et aux yeux
HT6 Syndrome du Doberman bleu	Problématiques liées à la robe et aux yeux
HT7 Sinus dermoïde	Problématiques liées à la robe et aux yeux
HT8 Syndrome du Colley gris	Problématiques liées à la robe et aux yeux



CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PHÉNOTYPE

Facteurs prédisposants

A quel âge apparaît le phénotype?

Le phénotype peut impacter la durée de vie du chien (sans traitement)

Le phénotype peut provoquer un inconfort évitable

Le phénotype peut provoquer de la douleur évitable chez le chien

Le phénotype peut provoquer des effets négatifs sur la santé à long terme (chronicité)

Le phénotype peut empêcher l'animal de manger et de boire normalement

Le phénotype peut empêcher l'expression des comportements normaux
(y compris relation à l'homme et aux autres animaux)

Le phénotype peut engendrer blessures et/ou maladies évitables

Le phénotype peut engendrer du stress /peur chronique

Le phénotype peut provoquer de l'anxiété

(anticipation pathologique, permanente, pas de stimulus)



CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PHÉNOTYPE (SUITE)

Le phénotype modifie l'aspect extérieur de l'animal

L'animal peut récupérer un état de bien-être après chirurgie ou autre traitement

Le phénotype est-elle fréquente chez le chien ?

Quelles sont les races les plus prédisposées au phénotype (non exhaustif) ?

Le phénotype est-elle transmise de génération en génération

Existe-t'il un test ADN?

Le phénotype "avilit" l'animal (dignité)

Le phénotype peut porter atteinte à l'intégrité physique du chien

Les autres pays et associations ont-ils pris une position vis-à-vis de ce phénotype ?

Fondements scientifiques?



HYPERTYPE DE LA BRACHYCÉPHALIE = SYNDROME BAOS (BRACHYCEPHALIC AIRWAY OBSTRUCTIVE SYNDROM)

Nez court et rapport longueur du chanfrein par rapport au crâne (vérifier standards)

Tous les brachys ne sont pas 'à problème' ...

Quels critères prendre en compte pour considérer qu'il s'agit d'un hypertype ?

Quelle relation entre les critères de brachycéphalie et le syndrome BAOS ?



NANISME ACHONDROPLASIQUE (DYSHARMONIE DANS LE NANISME)

Définir nanisme dysharmonieux

Dents manquantes (42 → 20) ou chute dentaire/tartre

Dystocie (bassin réduit chez la femelle - vérifier que nanisme achondroplasique et dystocie sont corrélés)

La césarienne permet d'assurer la vie des chiots (certains éleveurs y auraient recours systématiquement)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Achondroplasie>



PROBLEMES LOCOMOTEURS DYSPLASIE DE LA HANCHE

Hanches normales

Problème multifactoriel

(génétique + environnement),

quel lien avec les hanches basses, chez le B.All. ?

Qualité de vie ? Arthrose ...

Hanches anormales

'Placer' un chien
(posture d'exposition)

Posture basse du train arrière,
prise spontanément



PROBLÈMES LOCOMOTEURS PROBLÈMES OSTÉO-ARTICULAIRES

Ruptures de ligaments croisés : problèmes de régime alimentaire actuellement en Belgique (voir publi. Australienne) – alimentation C-profood (retours du terrain).



COMPORTEMENT B. COLLIE ET MALINOIS

Malinois de travail (police, armée): lignées de travail avec éleveurs très attentifs au comportement de leurs produits (sélection des personnes qui viennent acheter les chiots). Ce n'est pas le cas de tous les éleveurs (dont les chiens ne sont pas destinés à un travail). Problématique réelle en refuge (un grand %tage des Malinois abandonnés en refuge trouve difficilement à se faire adopter et vit très mal la vie en refuge). Race à la mode ('status dog').

Problèmes : Impulsivité, hyperactivité, anxiété, agressivité

Chien de travail qui se retrouve à ne rien faire d'autre que la Compagnie. S'observe aussi chez certains individus dont l'environnement correspond à leur sélection de chien de travail, laissant supposer qu'il y aurait une base génétique à ces problèmes comportementaux (voir travail TFE VT).

Seuil de déclenchement de la morsure abaissé (certains chiens mordraient plus vite que d'autres). Danger si vie avec des enfants ?

B. Collie: Travail des troupeaux → Agility, Ob-dancing, ... et effet de mode

Sensibiliser les éleveurs et le public (interdire ? Alternatives ? Comment lutter contre la clandestinité ?)



1. Ostéosarcome

2. Syringomyélie

3. Sarcome histiocytaire disséminé

4. Ostéochondrite disséquante

5. Dilatation/Torsion de l'estomac

6. Brachycephalic Obstruction Airway Syndrome (BOAS) + **Sinus dermoïde**
Intertrigo

7. Luxation de rotule

8. Ostéoarthrose

9. Cardiomyopathie dilatée

10. Dysplasie (coude, hanche)

11. Dysgénésie oculaire Merle

12. Collapsus trachéal



GT PHÉNOTYPES DÉLÉTÈRES: RECOMMANDATIONS

- Communication large

 - à tous les acteurs: vétérinaires, éleveurs, juges, citoyens

 - interdiction de publicité avec des phénotypes délétères

- Coordonner les actions aux niveaux national et international

- Mesures générales**: informer et faire prendre conscience – organiser des formations

- Encourager la recherche – Créer un comité d'experts en élevage canin

- Créer une banque d'ADN – Assurer une meilleure traçabilité des filiations

- Améliorer le contrôle en élevage



GT PHENOTYPES DÉLÉTÈRES: RECOMMANDATIONS

-Mesures sur les animaux d'élevage:

Une ou plusieurs solutions sont possible dépendant du cas, choisies en fonction des plans d'élevage, des risques d'apparition de phenotypes délétères et du maintien de la diversité génétique dans la race.

Identification de la capacité d'élevage de chaque reproducteur

à l'aide de tous les outils disponibles (examen clinique, examen complémentaire, autorisation d'élevage ou stérilisation, enregistrement officiel de la décision)

Par un comité d'experts – vétérinaires, indépendants

AGRESSIVITÉ CANINE

Race ou individu ?

Entre chiens et vis-à-vis de l'homme...



COMPORTEMENT SOCIAL ENTRE CHIENS

Disposer de signaux de communication, savoir les émettre et les recevoir
afin de les interpréter correctement



Signaux de communication visuelle: Tout le corps, parfois modifié par l'homme.
postures corporelles / mimique faciale / mouvements

Individu dominant: aspect général faisant paraître + grand,
se place perpendiculairement au corps du dominé

dominant agressif: idem + piloérection, myose, lèvres retroussées et dents extériorisées

dominé: cherche à paraître plus petit

dominé peureux: se recroqueville encore plus

soumission, apaisement

- active: ritualisation de la demande de régurgitation du chiot (néoténie)
- passive: dégagement du ventre, 'drapeau blanc'
(ritualisation de la demande de léchage ano-génital du chiot, néoténie)



- Invitation au jeu : posture typique, sauts, vocalisations, ...
- Mouvements de la queue: dans diverses circonstances (apaisement, curiosité, menace, agression possible)
- Posture de miction 'patte levée' + grattage du sol: attirer l'attention des congénères sur la présence d'un message olfactif
- Premiers contacts entre chiens:
 - exploration olfactive (tête puis région ano-génitale)
 - invitation au jeu OU poursuites



ORGANISATION SOCIALE

UM: Unique Male
UF: Unique Female

Loups (*Canis lupus*) et les autres canidés sauvages

- **Solitaires** (renard roux)
- **Couples** ou **groupes familiaux** (chacal, coyote)
- **Meutes** (loup gris): **groupe UM/UF**
 - * Groupe fermé avec hiérarchie de dominance **complexe (non linéaire !, pas d' ω)**
 - * 2 à 15 animaux (en majorité : <7)
 - * Marquage et défense d'une portion +/- grande du domaine vital par les dominants
(= territoire)
 - * Coopération (chasse, soins aux jeunes, ...)
 - * Un couple reproducteur avec quelques descendants et auxiliaires

Grande souplesse entre ces 3 types d'organisation:

- Possibilité de changer de structure sociale en fonction de l'environnement
- Plasticité de la notion de territoire, de la taille du territoire et du domaine vital



? Groupement chez le chien domestique (sur base d'études de chiens féroces)

**Structure MM/MF (multi) avec quelques descendants,
et/ou membres non apparentés**

MM: Multiple Males
MF: Multiple Females

**Sensu stricto : on ne peut pas parler de MEUTE de chiens
mais plutôt de GROUPE de chiens dont on ignore s'il y a une
hiérarchie de dominance/subordination vraie**

où les femelles élèvent les jeunes sans l'aide des autres
où une forte mortalité juvénile est observée
peu de chasse coordonnée, bruyante, plutôt charognards
pas de défense du territoire au sens strict

(Boitani & Ciucci, 1995)



INTERACTIONS SOCIALES AVEC LES HUMAINS ET AGRESSIVITÉ

On nous a tous appris que :

Famille = meute avec hiérarchie de dominance de l'homme et subordination du chien

Pour éviter les problèmes (chien qui réclame, monte sur le fauteuil, aboie, grogne, vole à table, ...), il faut dominer son chien

càd, comme chez les loups: manger avant son chien, le mettre sur le dos, prendre des initiatives, ...

C'est FAUX !

Le concept de dominance (priorité pour manger, se reproduire et se reposer) ne s'applique pas dans la relation homme-chien.

Tenter de l'appliquer augmente les interactions négatives avec son chien
installe une relation de mauvaise qualité avec lui



LA RELATION HOMME-CHIEN, NOUVELLE INTERPRÉTATION

➤ Bradshaw (2009)

➤ Titeux & al (2013)

- ~~Concept de dominance~~
- Leadership

- Balance des interactions

déplacement
coopération
interspécifique



Attitude d'approche positive d'un chien

- Approche
- Oreilles vers l'avant
- Pas de tension
- Battement de la queue
- Flairage, léchage
- Sollicite la caresse



GESTION DES CONFLITS

Si un combat a lieu entre chiens,

- l'arme principale = denture
- avec des coups de pattes, bousculades

→ le vainqueur jette l'autre au sol, l'y maintient sous la menace

→ le vaincu adopte une position de soumission

→ arrêt du combat, signaux d'apaisement échangés

(léchage, mordillements, ...)

Peur exprimée par un chien



par ordre croissant:

- bailler, cligner des yeux, se lécher le nez / détourner la tête / détourner le corps, s'asseoir, piétinement / s'éloigner / observer en portant les oreilles vers l'arrière / porter un profil bas, la queue entre les postérieurs / se couche, lève une patte / se raidit, fixe du regard / Grogne / Claque des dents / Mord

Menace exprimée par un chien

Par ordre croissant

Regard fixe, œil ouvert (blanc de l'œil)

Posture debout, raide, vers l'avant

Oreilles vers l'avant ou l'arrière

Aboiement

Retroussement de la lèvre supérieure

Grognement (associé à la posture raide)

Projection du corps vers l'avant (bouche ouverte)

Morsure à vide ('snap'), non tenue ('open bite'), tenue ('grab bite')



DIFFÉRENTES FORMES DE MORSURES CANINES

(Classification d'après Gilbert, 2015)

- Agression = l'intention est de faire reculer l'autre

- par auto-protection

Morsure défensive

- peur : problèmes de familiarisation à l'homme
problèmes de socialisation aux chiens
tempérament
- douleur
- tempérament agressif
- mauvaise relation homme-animal
- problème dans les apprentissages

- pour la protection/possession d'une ressource

Morsure offensive

- ressource= objet, lieu, nourriture, chiots, liberté d'agir
- mauvaise relation homme-animal
 - tempérament revendicateur
 - problème dans les apprentissages

- Prédation = l'intention est de capturer l'autre



- Comportement de prédation :

Chasse solitaire ou en groupe (bruyante !)
poursuite et capture

Facilitation sociale et coopération

Pas de signaux de menace, gestes ou grondements

Pas d'éveil du système nerveux (orthosympathique)
(sauf si proie de grande taille=danger)



APPROCHER ET MANIPULER UN CHIEN

- Examen du chien à distance :
observer avec attention et savoir ce qu'on doit/ne veut pas voir :
comportements normaux, état corporel, signes de maladie,
douleur, lésion, stress, modifications individuelles, jeu, réaction
à la présence de l'homme
- Examen avec manipulations : **contention** de la gueule !
 - Tempérament peut changer si douleur (gentil → agressif)
 - S'adapter à la taille du chien (sur table non glissante ou au sol)
 - Approche progressive, calme, sans élever à la voix
 - Pas de regard direct, friandises, se laisser renifler
 - Immobiliser un chien (manuellement ou avec une muselière)
 - Ouvrir la gueule d'un chien (manuellement ou avec un lien entre les canines)

CONCLUSION

Importance des interactions homme-chien !



- Bien héberger et élever des chiens est une responsabilité, qui inclut d'informer le (futur) propriétaire de leurs particularités
- Comprendre les règles qui régissent la reproduction et les tares héréditaires.
Bien sélectionner ses reproducteurs
- Apprendre à décoder le langage canin et ses motivations à mordre



CONCLUSION

- Encore des questions?
- Envoyez-les à :

- bienetreanimal@environnement.brussels
- dierenwelzijn@leefmilieu.brussels

Merci pour votre attention!