BIEN-ÊTRE ANIMAL

FORMATION NACS À POILS

ETABLISSEMENTS AGRÉES

Notes de cours préparées par Laetitia GIORDANO

(HeLHA - *giordanol@helha.be***)**

07 NOVEMBRE 2022 (4H30)

bruxelles environnement .brussels

PLAN

Généralités

Espèce par espèce

Besoins éthologiques
Conditions optimales d'hébergement
Alimentation
Principales pathologies
Indicateurs de bien-être

Cas pratiques d'évaluation du bien être

I. GÉNÉRALITÉS



GÉNÉRALITÉS

Petits mammifères domestiques

- Rongeurs et lagomorphes
- Petits et « mignons »
- A la mode
- Moins contraignants
- Durée de vie courte
- Investissement –
- Facilité d’accès (achat impulsif…)

GÉNÉRALITÉS

Marché qui se développe

- Eleveurs
- Magasins
- Espèces prolifiques

Sélection génétique

Espèces et races +++

GÉNÉRALITÉS

Espèces avec besoins particuliers

- Sociaux
- Exploratoires
- Alimentaires
- …

Méconnaissance du public

Souvent jeunes propriétaires

Informations à l'achat ?

Valeur moindre → moins d'attention, de soins…

GÉNÉRALITÉS



GÉNÉRALITÉS



GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Mycoses

- Teigne

Parasites

- Internes
  - Coccidioses
    - Intestinale
    - Hépatique
  - Verminoses

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Parasites

- Externes
  - Puces, tiques, gales, poux …

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Maladie de Tyzzer

- Rongeurs et lapin
- *Clostridium piliformis*
- Diarrhée (hémorragique)
- Anorexie
- Mort
- Elevages intensifs

- Spores très résistantes dans l'environnement (un an)
- Porteurs sains

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Maladie de Tyzzer

- PROPHYLAXIE générale
  - Hygiène !!!
  - Pas de surpopulation
  - Eviter le stress
  - Quarantaine des nouveaux arrivants
  - Isolement des malades
  - Observation

- Vermifugation
  - FURET (alimentation fraiche – BARF)

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Maladies respiratoires

- *Pasteurella sp., Chlamydophila caviae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella bronchiseptica* (cobaye !)*, Pseudomonas sp., Mycoplasma sp* (rat)
- Rhinites – sinusites - pneumonie
- Infectiosité +++
- Toujours graves quand symptômes (Jetage peu fréquent → atteinte évoluée)
- Respiration nasale obligatoire chez rongeurs et lagomorphes
- Portage sain

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Maladies respiratoires

- SYMPTOMES
  - Eternuement
  - Dyspnée
  - Respiration bruyante
  - Jetage
  - Chromodaccryorrhée (rat et souris)
  - Abattement
  - Anorexie
  - Amaigrissement

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Maladies respiratoires

- COMPLICATIONS
  - Atteintes de l'oreille moyenne → port de tête penché
  - Fibrose ou abcès pulmonaires
  - Déformation des cornets nasaux

- PROPHYLAXIE
  - Mesures sanitaires (hygiène, quarantaine, …)
  - Mesures environnementales (éviter stress, surpopulation, litières poussiéreuses ou parfumées, courant d'air…)

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Encéphalitozoonose

- *Encephalitozoon cuniculi*
- Lapin, rat, souris, hamster, cobaye, …
- Mais aussi chien (porteur sain excréteur de certaines souches), cheval et homme (immunodéprimés)

- SYMPTOMES
  - Syndrôme vestibulaire
    - Port de tête penché
    - Nystagmus
    - Ataxie
    - Tourner en rond
  - Paralysie
  - Convulsion
  - Atteinte oculaire: Uvéite

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Encéphalitozoonose

- Portage chronique
- Récidives symptomatiques possibles (poussées)

- *PREVENTION*
  - Hygiène
  - Fenbendazole (éviter poussées)
  - Ne pas mettre en contact animaux positifs et négatifs
  - Zoonose

GÉNÉRALITÉS – INFECTIONS NON SPÉCIFIQUES

Endoparasites

- Helminthes
  - Oxyures (toutes les espèces)
  - Cestodes (lapin, petits rongeurs)
    - Dont *Hymenolepsis* chez l'hamster (Zoonose)

- Coccidies
  - *Eimeria* (lapin, cobaye, chinchilla)

→Contrôle et nettoyage des aliments entrants (frais)

→Prophylaxie

EVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ

Que vérifier en collectivité?

- Etat d'embonpoint
- Etat du pelage
- Peau (présence de puces, gales, plaies, croutes…)
- Etat d'hydratation
- Yeux (larmoyants, pus, rouges…)
- Oreilles (saleté, présence de gales, …)
- Ecoulement nasaux
- Respiration, toux, diarrhée

+ environnement

A, B, C, D, E

HÉBERGEMENT

Paramètres à contrôler

- Ventilation (taux de renouvellement de l'air)
- Taux d'humidité
- Luminosité
  - Nombre de lux: >700Lux nocifs pour albinos
  - Durée des cycles jour-nuit (Repro)
- Température
- Absence de courant d'air

Perturbations

- Bruits (nocifs si >50-70dB chez rongeurs et lapins)
- Présence d'autres espèces

HÉBERGEMENT

Sources de contamination les plus fréquentes

- Litières
  - Hygiène
  - Ammoniac
- Abreuvoirs
  - Préférer biberons aux écuelles
  - Hygiène !!!
- Aliments
  - (contact avec nuisibles) → stockage
  - Propreté des gamelles

HÉBERGEMENT

Enrichissements

- **Structurels**
- **Alimentaires**
- **Sociaux**
- **Sensoriels**
- **Cognitifs**

- Risques

ALIMENTATION

Rongeurs mais tous différents

- **Herbivores stricts**
- **Herbivores**
- **Omnivores**

BESOINS	SOURIS	RAT
PROTEINES (%) -Entretien -Croissance -Reproduction	 12.5 12.5 20-24	 10 20 20
LIPIDES (%)	< 5	5
Calcium	0.4	0.5

Besoins varient selon le stade physiologique

ALIMENTATION

Herbivores → base de la ration = **FOIN**

Aliments concentrés extrudés >>> mélange de graines

- A limiter
- Complémenter

Attention friandises

Besoins spécifiques (Cobaye et vit C)

DES INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE EN GÉNÉRAL

L’OBSERVATION DE…

- COMPORTEMENTS « NORMAUX » DE L’ESPÈCE
  - ALIMENTATION
    - PRÉVOIR PLUSIEURS SOURCES DE NOURRITURE POUR LES GROUPES
  - NETTOYAGE
  - EXPLORATION
    - SUFFISAMMENT D’ENRICHISSEMENTS
  - INTERACTIONS SOCIALES
    - EN ACCORD AVEC LA STRUCTURE SOCIALE DE L’ESPÈCE
  - JEUX

L’OBSERVATION DE…

- PELAGE DE QUALITÉ

L’OBSERVATION DE…

- POSTURES NORMALES

- FRÉQUENCES DE NETTOYAGE ADÉQUATES

L’OBSERVATION DE…

- BON ÉTAT D’EMBONPOINT

L’OBSERVATION DE…

- BON ÉTAT GÉNÉRAL
  - SANS LÉSIONS D’AGRESSION, DE MUTILATION…
  - ABSENCE DE MALADIES

- PHASES DE REPOS SEREINES
  - PAS UN ANIMAL EN PERMANENCE AUX AGUETS

L'OBSERVATION DE…

- COMPORTEMENTS « NORMAUX » DE L'ESPÈCE

→ PAS DE COMPORTEMENTS ANORMAUX : **STÉRÉOTYPIES**

« COMPORTEMENTS ANORMAUX, RÉPÉTITIFS CAUSÉS PAR UNE FRUSTRATION OU UNE DYSFONCTION DU SYSTÈME NERVEUX »

- VARIABLITÉ D'ESPÈCES
  - SOURIS, RATS >>> COBAYE, LAPIN

LA STÉRÉOTYPIE SIGNE T'ELLE TOUJOURS UNE ATTEINTE ACTUELLE DE BIEN-ÊTRE?

II. PARTICULARITÉS PAR ESPÈCE

Lapin

Cobaye

Chinchilla

Furet

Souris

Rat

Hamster

LE LAPIN

LE LAPIN

- Lagomorphe
- 800g à 10Kg
- Des centaines de races
- Espérance de vie: 7 - 8ans
- Animal grégaire
- Sensible au stress
- Curieux
- Bonnes capacités d'adaptation
- T° idéale: 18-21°C
  - >30°C → fatal

- Généralités

LE LAPIN

- Contention

- Généralités

LE LAPIN

Contention

- Généralités

LE LAPIN

Comportement alimentaire

- Herbivores sélectifs
- Alimentation continue (60% de sa consommation en obscurité 12-12h)
- Apport suffisant en fibres
  - Risque d'obstruction
  - Usure dentaire
- Ration adaptée
  - Pas de granulés à volonté!

- Transition alimentaire cruciale

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

Comportement alimentaire

- Caecotrophie
  - Apport Vit B
  - Protéines bactériennes

- Anorexie → toujours pathologique
- Ne doit pas rester à jeun → stase intestinale

- Contrôler régulièrement cavité buccale

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement dipsique**
  - 50-150ml d'eau/Kg/jour
  - Sensible au gout de l'eau de boisson

→ A renouveler quotidiennement

- Besoins éthologiques

- **Au biberon** de préférence
- Vérification 1x/jour minimum !

LE LAPIN

- **Comportement d'élimination**
  - Caecotrophes
  - Zone de miction-élimination (change partiel de cage)
  - Apprentissage du bac à litière

  - Attentif aux diarrhées et Constipations

  - Miction
    - Léger relevé de la queue
    - En jet chez les mâles non castrés (marquage)
    - Urine très dense / porphyrine → stress

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement exploratoire**
  - Animal curieux
  - Déplacements +++
  - → Besoin de se dépenser

- Besoins éthologiques

  - Position sur pattes arrières fréquente
  - Apprécie vue en hauteur
  - Creuse tunnels et terriers

LE LAPIN

- **Comportement exploratoire**
  - Assez développé
  - Comportement ludique
  - Besoin de stimulations
    - Tunnels (terriers)
    - Toboggans
    - Boites en carton (non traités)
    - Bois non traités

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement exploratoire**
  - Mais aussi…
    - Craintif
    - Vite stressable – cardiaque

    → Habituation et cachette

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement social**
  - Animal grégaire
  - Contact +++
  - Hiérarchie de dominance par sexe

- Besoins éthologiques

♂	♀
-Territoriaux -Chasse les autres mâles → repro avec plus de femelles -Surtout à partir d'1an	-Non territoriales -Vivent en petit groupe hiérarchisé → Accès aux meilleurs terriers

LE LAPIN

- **Comportement social**

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement social**

  - Relation agonistique
    - Morsures
    - Coups de griffes
    - Course-poursuite
    - Position de dominance-soumission
    - CPT de monte

  → Cohabitation entre mâles difficile (sauf si même fratrie) ou habituation dès le plus jeune âge

  → Possibilités de fuite

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement reproducteur**

  - Puberté : 4 à 8 mois
    - Dépend de la taille
  - Reproduction toute l'année dans les 2 sexes

→ Ovulation provoquée

→ Acceptation du mâle déjà 1-2 jours après la mise-bas

  - Amener la femelle au mâle et pas l'inverse

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement reproducteur**

  - Comportement maternel
    - Gestation: 29 à 35 jours
  - Parfois pseudogestation
    - Nécessite de stériliser la femelle si fréquent (animaux de compagnie)
  - Fabrication d'un nid fermé
    - paille
    - foin
    - poils (qq heures avant mise-bas)
  - Taille de la portée: 4 à 10 jeunes

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement reproducteur**
  - Mise-bas
    - Plus souvent le matin
    - Durée : 30min
  - Placentophagie
  - Reconnaissance olfactive des lapereaux
    - Adoption difficile sauf si frottement des orphelins avec les petits de la portée
    - Ne pas déranger, ni toucher les petits les 1ers jours
- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement reproducteur**

  - Allaitement
    - Matin et soir
    - 4min en moyenne

  - Espèce nidicole

  - Aucun soin apporté par la mère
    - Défécation facilitée par stimulation
    - 10jours: acquisition des poils
    - Sortie du nid vers 3 semaines / Ingestion d'aliments solides
    - Sevrage définitif: 8 semaines

  → Mère doit pouvoir s'extraire de ses jeunes

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Comportement de toilette**
  - Très développé
    - Léchage
    - Nettoyage avec les antérieurs
    - Grattage
    - Allogrooming
  - Excès → troubles du comportement

- Besoins éthologiques

LE LAPIN

- **Herbivore**
  - Foin, Foin et foin !!!
  - Concentrés (pellets > mélanges) – quantité déterminée
  - Aliments frais, herbe (avec transition !!!),

- Alimentation

Fourrages frais préconisés	Aliments toxiques
Feuilles de luzerne, de radis, de framboisier, de fraisier, de betterave, de trèfle ... **Feuilles et fleurs de pissenlits, fenouil** **Basilic, persil (pas aux femelles en gestation ou allaitantes), épinard, cresson, chicon** **Salade (de blé, batavia, feuille de chêne, pain de sucre, roquette, frisée, romaine),** **Chou et carotte (en petite quantité),** **Concombre et courgette (sans les graines)** **Feuilles de menthe, origan, romarin, thym, aneth ...**	Soja, avocat, chou blanc, noisette, oignon, pomme de terre, ail, rhubarbe et verts de poireaux

LE LAPIN

- **Pathologies d'origine alimentaire**

- Alimentation

  - Diarrhées, entérotoxémie
    → TRANSITION ALIMENTAIRE

  - Trichobézoards → constipation

  - Hypocalcémie en lactation
    → Adapter ration gestation-lactation

  - Obésité
    → Limiter les concentrés, éviter les friandises
    → Favoriser exercices

LE LAPIN

- **Pathologies virales**
  - Myxomatose
  - Maladie hémorragique

- Pathologies

Transmis par vecteurs → importance de la lutte contre les insectes + VACCINATION

- **Pathologies bactériennes**
  - Respiratoires (pasteurelloses, …)
  - Digestives (entérite à *Clostridium, E, Coli*…)

LE LAPIN
QUESTION DE BIEN-ÊTRE

Structure sociale respectée

- Au moins un congénère
- Si pas : compagnon d'une autre espèce (chien, chat, cobaye…)

Hébergement adéquat

- Cage suffisamment grande : min 1m sur 50cm, hauteur permettant de se mettre debout
- Possibilités de se cacher
- Besoin de se dépenser → Sorties de cage fréquentes (parc, espace sécurisé)
- Au calme
- Enrichissements (Matériel à ronger, toboggans, tunnels…)

Fourrage grossier (foin et paille)

Manipulation en douceur

ATTEINTE DU BIEN-ÊTRE

- Anorexie, diminution d'appétit
- Diminution de l'activité, isolement
- Nettoyage excessif
- Dépilations
- Pelage terne et souillé
- Ronge ses barreaux
- Porphyrinurie
- Symptômes respiratoires (ventilation, hygiène, …)

ATTEINTE DU BIEN-ÊTRE

- Grimace scale

(douleur aigue)

ATTEINTE DU BIEN-ÊTRE

- Grimace scale

LE LAPIN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Directives techniques concernant la protection des animaux chez les Lapins

Manuel de contrôle - Protection des animaux

1er septembre 2020

- Ressources

Disponible sur: https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/kaninchen.html

‹ Protection des animaux

Détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages

Chiens
Chats
Furets
Chevaux
Lapins
Cochons d'Inde
Rats
Gerbilles
Hamster doré
Cailles
Pigeons

Lapins

Les lapins ont besoin d'enclos spacieux et bien agencés, leur permettant de bouger librement tout en ménageant des possibilités de se cacher. Les lapins sont des animaux sociables qui ont besoin de contacts avec leurs congénères. Ce sont non seulement des animaux de compagnie mais aussi des animaux de rente.

Comme animaux de compagnie, les lapins sont très appréciés, en particulier des enfants. Ils n'aiment pourtant pas être portés, ni câlinés. Ils se figent de peur et peuvent alors griffer et mordre. Si les lapins vivent avec leur groupe dans un enclos agencé de manière à répondre à leurs besoins, parents et enfants peuvent observer avec plaisir leur comportement naturel sans avoir à les saisir ou à les sortir de l'enclos.

La détention de lapins de race est une activité de loisir consistant à élever des races spécifiques et à présenter les animaux à des expositions.

› Détention et soins
› Contacts sociaux
› Exercice et occupation
› Nourriture et eau
› Élevage
› Le lapin comme animal de rente

LE LAPIN





https://www.ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Experimentation_animaux_Vol1.pdf

http://ca-fr.hagen.com/File/5bd089ef-e6d0-4638-9379-b9d08e32f864

LE LAPIN



- Ressources

https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/RbtGS%20Manual.pdf

LE COBAYE

LE COBAYE

- Rongeur de la famille des Caviidae
- Animal grégaire
- Poids adulte : 1Kg à 1,4Kg
- Vite stressable
- Vie en intérieur ou en extérieur
- A l’abri des courants d’air
- Espérance de vie : 5 à 8 ans

- Généralités

LE COBAYE

- Vibrisses servent à s'orienter dans l'obscurité
- Vision à 340° (proie)
- Ouïe et odorat bien développés
- Vocalisations +++

- ~~Grande sensibilité digestive~~

(contention !)

- Généralités

LE COBAYE

- **Comportement alimentaire et dipsique**
  - Herbivore (céréales)
  - Mange en continu (jour et nuit)
  - Consomme en moyenne 30-60g d'aliments/jour
  - Boit en moyenne 50-100ml d'eau / jour
    - De préférence au biberon
    - Par aspiration et non lapage
  - Vocalisations de quête de satisfaction
  - Compétition alimentaire rare

- Besoins éthologiques

LE COBAYE

- **Comportement d'élimination**
  - Caecotrophie
  - Emission au hasard
- Besoins éthologiques

LE COBAYE

- **Activité veille-sommeil**

  - Sommeil: 28% du temps
  - Rythme d'activité
    - Activité presque continue chez cobaye domestique
    - Activité crépusculaire si vie en semi-liberté/sauvage

  - Alternance rapide de phases d'activités et de repos

  - Activité diminue si T° ambiante augmente

  - T° idéale: 17-22°C
    - Coup de chaleur

  - Méfiant, explore moins que lapin, rat et souris

- Besoins éthologiques

LE COBAYE

Comportement social

- Animal grégaire
- Mâles territoriaux
- Hiérarchie de dominance
- Communications
  - Contact bucco-buccal
  - Mutual-grooming
  - Reconnaissance par flairage ano-génital
  - Vocalisations

- Comportement agonistique
  - Coups de museau, morsures

→ **+++ si surpopulation**

- Besoins éthologiques

LE COBAYE

- **Comportement reproducteur**

- MATURITÉ SEXUELLE
  - 2-3 MOIS CHEZ LES FEMELLES
  - 3-4MOIS CHEZ LES MÂLES

- Besoins éthologiques

- DURÉE DE GESTATION : 59 À 72 JOURS (68 JOURS EN MOYENNE).
- TAILLE MOYENNE DE LA PORTÉE : 2 À 4 JEUNES
- LES JEUNES SONT NIDIFUGES
- LE SEVRAGE A LIEU À 3 SEMAINES
- VIE EN HAREM

LE COBAYE

- **Comportement reproducteur**

- Besoins éthologiques

- PAS DE 1ÈRE MISE À LA REPRO DES FEMELLES APRÈS 10 MOIS
  - **SOUDURE DES OS DU BASSIN**

→ Stérilisation préconisée si risque de gestation

LE COBAYE

- **Herbivore**
- **Particularités**

  - Ne synthétise pas de vitamine C

  - Transit digestif très lent
    - → Prédispositions aux affections digestives
    - → Eviter les changements fréquents d'aliments
    - → Toujours longue période de transition

- Alimentation

LE COBAYE

- **Ration**

- Foin : indispensable
- Légumes
  - 10% du poids
- Fruits
  - 10-20g 2x/semaine

- Alimentation

Légumes	Fruits
Chicon, fenouil, céleri, pissenlit, épinard, chou, brocolis, carotte (fanes et racine), salade, betterave, poivrons, ...	Kiwi, orange, pomme, poire, banane, abricot, ananas, raisin, fraise, mandarine, mûre...

LE COBAYE

- **Ration**

- Granulés

  - En quantité limitée
  - Extrudés de préférence
  - Pas d'aliments pour lapins

- Vitamine C

  - Quotidiennement
  - Eau de boisson (change journalier)
  - Directement per os

- Alimentation

LE COBAYE

- **Pathologies d'origine alimentaire**

  - Calcifications exagérées
    - Excès Vit A, Vit D, Ca
  - Usure insuffisante des dents
  - Fermentation excessive (tympanisme)
  - Entérites
    - Manque de cellulose
    - Changements alimentaires
    - Antibiothérapie
    - Arrêt de l'alimentation durant plusieurs jours
  - Constipation

  - Alimentation

LE COBAYE

- **Pathologies d'origine alimentaire**

  - Carence en vitamine C
    - Anorexie
    - Troubles locomoteurs
    - Apathie
    - Saignements gingivaux

  - Alimentation

LE COBAYE
QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HEBERGEMENT
  - Minimum 2 individus
  - Chacun son espace vital

  - INTERIEUR
    - Cage: 1,20m sur 45cm minimum pour 2 individus
    - Possibilité de sortir de sa cage
    - Cachettes (une pour chacun)
    - Plusieurs gamelles si males

  - EXTERIEUR
    - A l'abri du froid, des courants d'air
    - Abri isolé (t° optimale de confort entre 15 et 26°C)
    - Attention aux variations de t° !
    - Protection contre les prédateurs ET SOURCES DE STRESS

LE COBAYE
QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- LES ENRICHISSEMENTS
  - TUNNELS
  - PARCOURS
  - COIN REPOS
  - ! CHUTES

- DÉPENDANT DES HABITUDES
  - DIFFICULTÉ DE CHANGER DE LITIÈRE, TEMPÉRATURE, ENVIRONNEMENT… APRÈS LA PUBERTÉ

→ SOURCE DE STRESS +++

ATTEINTE DU BIEN-ÊTRE

- ANOREXIE
- ARRÊT DE TOILETTAGE
- APATHIE
- DEPILATIONS
- MORDILLEMENTS SUR LUI-MÊME OU CONGÉNÈRE
- PORPHYRINES DANS LES URINES
- RONGE LES BARREAUX DE LA CAGE
- OBSTRUCTION INTESTINALE (ILÉUS, MANQUE DE FIBRES…)

- Ressources

- http://www.cobayesclub.com/cochon_inde.htm

LE CHINCHILLA

- RONGEUR
- 2 ESPÈCES DANS LA NATURE
  - *C. laniger*
  - *C. brevicauda*
- ANIMAL DOMESTIQUE
  - *C. laniger* x *C. brevicauda*
  - ELEVAGE POUR FOURRURE / ANIMAL DOMESTIQUE
  - SÉLECTION MORPHOLOGIQUE (COULEURS)

- POIDS : 450 À 800G (FEMELLES > MÂLES)
- ESPÉRANCE DE VIE: 10 ANS

GÉNÉRALITÉS

Indépendant

Vif et curieux

Apprécie moyennement la manipulation, les caresses…

- → Importance de la socialisation dès le plus jeune âge (< 1mois)

Pattes arrières bien développées → sauteur

CONTENTION

Manipulation avec douceur

! Vif → chutes

Jamais par la queue

Contention en C

Technique de l’essuie

LE CHINCHILLA

- **Comportement alimentaire et dipsique**

  - Herbivore strict
  - Nocturne et crépusculaire

  - Consomme en moyenne 40-50g d'aliments/jour
    - 90g en frais
    - 30g de concentrés

  - Eau: 10-20mL/jour

- Besoins éthologiques

LE CHINCHILLA

- **Comportement exploratoire**
  - Crainte >< Curiosité
  - Vite stressable
  - Activité nocturne et crépusculaire mais bonne adaptation diurne
  - Rongeur +++
  - Sauteur

- Besoins éthologiques

LE CHINCHILLA

- **Comportement social**

  - Animal grégaire
  - Colonies de 10 à 100 individus à l'état sauvage
  - Idéalement minimum 2 en captivité
    - Même sexe
    - Se connaissent depuis le plus jeune âge
  - Communication auditive et tactile +++

- Besoins éthologiques

LE CHINCHILLA

- **Comportement reproducteur**

- MATURITÉ SEXUELLE
  - MÂLES: 9 MOIS
  - FEMELLES: 4-5 MOIS (RECOMMANDÉ D'ATTENDRE 9 MOIS POUR 1ÈRE PORTÉE)
- GESTATION: 110-120 JOURS
- PORTÉE MOYENNE: 2 (1-5)
- ESPÈCE NIDIFUGE
- SEVRAGE : 6ÈME SEMAINE

- Besoins éthologiques

LE CHINCHILLA

- **Herbivore strict**
  - **Besoin en fibres +++ → FOIN !!!**
  - **Aliments extrudés (18-20% de protéines)**
  - **Eviter les végétaux frais**
    - **Dérive de flore +++**

- **Besoin accru de ronger**
  - **Branchages**

- **Très sensible aux changements alimentaires !**
- **Principales pathologies d'origine alimentaire**
  - Problèmes dentaires
  - Tympanisme – dérive de flore
  - Constipation (trichobézoards, manque de fibre…)

  - Sensible aux urolithiases → Eau renouvelée régulièrement

- Alimentation

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- **HÉBERGEMENT**
  - PIÈCE CALME ET FRAICHE (IDÉALEMENT 15°-22C)
  - INCONFORTABLE > 25°C
  - COUP DE CHALEUR > 28°C
  - PAS DANS ZONE DE PASSAGE
  - EVITER COURANTS D'AIR, RAYONS DIRECTS DU SOLEIL, …
  - ACTIVITÉ NOCTURNE → ÉLOIGNÉ DU LIEU DE REPOS DES PROPRIÉTAIRES

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- **CAGE**
  - SUFFISAMMENT GRANDE, EN HAUTEUR SUR PLUSIEURS ÉTAGES
  - EX: L 100 X L 70 X H 170 CM POUR 2 À 3 INDIVIDUS MAXIMUM
  - CACHETTES EN HAUTEUR (MAISONNETTE, TUYAUX…)
  - PASSERELLES, PLATEFORMES, …
  - POTENTIELLEMENT UNE ROUE (PLEINE ET SUFFISAMMENT GRANDE)

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- BAC À SABLE OU SUBSTRAT SPÉCIFIQUE POUR CHINCHILLA

- IDÉALEMENT SORTIE MIN 1H/JOUR

  - TOUJOURS SOUS SURVEILLANCE
  (RONGEUR, RISQUES AVEC AUTRES ANIMAUX…)

ATTEINTE DE BIEN-ÊTRE

- ANOREXIE
- SE CACHE EN PERMANENCE
- POSTURE DOS VOUSSÉ
- ABSENCE DE RÉACTION AUX STIMULI HABITUELS
- RONGE SES BARREAUX
- MANQUE DE MOBILITÉ
- RÉACTIONS AGRESSIVES

)

RESSOURCES

CANADIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

RECHERCHE

Lignes directrices de l'ACMV sur l'utilisation vétérinaire des antimicrobiens ACCÈS

À propos de l'ACMV | Valeur de l'adhésion | RVC / RCRV & petites annonces | Politiques et défense des intérêts | Science et connaissances | Pratique et finances | Ressources publiques | Section ACMV-SBCV

POUR PROTÉGER LA SANTÉ DE VOTRE CHINCHILLA PENDANT TOUTE SA VIE

Le 24 octobre 2012

https://www.veterinairesaucanada.net/documents/keeping-your-chinchilla-in-good-health-for-life

LE FURET

LE FURET

- MUSTÉLIDÉ
- CARNIVORE
- POIDS MAX 2KG (MÂLES)
- LONGÉVITÉ: 8 À 10 ANS
- INSTINCT POTENTIEL DE CHASSE CONSERVÉ
- ~~PRÉDATEUR → SOCIABILISATION IMPORTANTE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE~~
- ODEUR MARQUÉE
- ANIMAL DIURNE (MALGRÉ PHASE DE REPOS LE JOUR)
- CAPACITÉS D'APPRENTISSAGE +++

- Généralités

LE FURET

- **CONTENTION**
  - ! Morsures !

- Contention

LE FURET

Comportement alimentaire et dipsique

- Carnivore obligatoire
- Prédateur
  - Instinct de chasse (! Cohabitation)
  - Domestiqué pour cela au départ
- Néophobe
  - Préférence olfactive acquise
- Transit rapide (182h)
- Solitaire pour l'alimentation

- Consommation en plusieurs repas sur la journée (9-10)
- Consommation d'aliment : 140-190g/jour
- Consommation d'eau : 75-100mL/jour

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Comportement exploratoire**

  - Déplacements +++
  - Très actif lors des phases de réveil
  - Curieux
  - Peu craintif
  - En hauteur (domestiques)
  - Creusement de terriers
  - Comportement ludique +++
    - Attrait pour les jeux qui couinent
  - Bonnes capacités d'adaptation

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Comportement d'élimination**
  - Souvent aux mêmes endroits
  - Marquage
  - Apprentissage du bac à litière mais…
    - Nettoyage !

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Comportement social**

  - Sauvage (solitaire) >< Domestique (grégaire)
  - Phase critique de socialisation
    - Entre 4 et 10 semaines
  - Hiérarchie sociale ?
  - Jeux, morsures, agressions

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Comportement veille-sommeil**

- ANIMAL DIURNE MAIS
  - ALTERNANCE PHASES RÉVEIL – SOMMEIL
  - DORT 16-18H/JOUR

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Comportement reproducteur**

- PUBERTÉ : 5 À 9 MOIS
- FEMELLE EN CHALEUR PERMANENTE SI NON SAILLIE
  → HYPEROESTROGÉNISME
  → RISQUE D'APLASIE MÉDULLAIRE
- OVULATION INDUITE
- STÉRILISATION DES FEMELLES NON DESTINÉES À LA REPRODUCTION
- SECRÉTION SÉBACÉE +++ DURANT SAISON DE REPRODUCTION (MÂLES)
- GESTATION 41 À 42 JOURS
- PORTÉE MOYENNE: 8 JEUNES
- ESPÈCE NIDICOLE
- SEVRAGE: 8 SEMAINES

- Besoins éthologiques

LE FURET

- **Carnivore obligatoire**
- Besoins nutritionnels
  - Proches du chat
    - Protéines: 34 – 47%
    - MG : 20 – 28%
    - Glucides : Max 22 – 24%
  - Besoins en énergie à l'entretien
    - >>> chat
    - 200 – 300 Kcal/Kg PC/jour

- Alimentation

! Besoins énergétiques augmentent de 30% en hiver (extérieur)

LE FURET

- **Rations**
  - **Aliment pour CHATONS**
    - Min 5000Kcal/Kg d'aliments
      + complémentation
  - **Alimentation spécifique pour furets**

→ Aliments secs : libre service

  - **Alimentation BARF**
    - Proies entières (poussins, souriceaux…)
    - Mélanges muscles-os-abats
    - Ca/P !

- Alimentation

LE FURET

- **Pathologies d'origine alimentaire**
  - Carences nutritionnelles
    - Acides gras essentiels
    - Taurine
    - Protéines d'origine animale
      - Ralentissement de la croissance
      - Troubles de la reproduction
      - Défaillance du système immunitaire
  - Sensibilité aux calculs urinaires

- Alimentation

LE FURET

- **Principales pathologies**
  - Insulinome
  - Hyperadrénocorticisme – Maladie surrénalienne

- Pathologies

- Maladie de carré → Vaccination
- Grippe à virus influenza
  - ! Zoonose
- Diarrhée catharrale épizootique (coronavirus)

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HÉBERGEMENT
  - LOGEMENT
    - S'ADAPTE AUX T° ENTRE 5°C ET 20°C
    - SENSIBLE AUX COUPS DE CHAUD (>26°C)
    - BONNE VENTILATION
    - BONNE ISOLATION
    - ABRI HUMIDITÉ
    - SANS COURANTS D'AIR
  - COHABITATION POSSIBLE AVEC ANIMAUX D'AUTRES ESPÈCES (CHAT, CHIEN … ATTENTION AUX PROIES) MAIS SOCIABILISATION !

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HÉBERGEMENT
  - CARNIVORE DOMESTIQUE MAIS…
  - LOGEMENT DIFFÉRENT SANS SURVEILLANCE
  - CAGE SUFFISAMMENT GRANDE EN HAUTEUR SUR PLUSIEURS ÉTAGES
    - EX: L 79 X L 52 X H 140 CM
      POUR UN À TROIS INDIVIDUS MAXIMUM
    - COIN LITIÈRE POUR ÉLIMINATION (CHATS)
    - LITIÈRE À COPEAUX SUR LE RESTE DU SOL
    - CACHETTES, TUYAUX, PASSERELLES, HAMAC, …

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HÉBERGEMENT
  - LOGEMENT EXTÉRIEUR
    - PETITES MAILLES
    - RÉSISTANT
    - FUITES ET PRÉDATEURS
    - PAILLE ET LITIÈRE DE COPEAUX
    - CLÔTURES 50CM DANS LE SOL
    - PARC EXTÉRIEUR ATTENANT POSSIBLE

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HÉBERGEMENT
  - SORTIE MIN 1H/JOUR (IDÉALEMENT 4H/JOUR)
  - CONTACTS SOCIAUX – MANIPULATION !

Intérieur	Extérieur
• Endroit sécurisé	• Au harnais • Pas de rappel

ATTEINTE DE BIEN-ÊTRE

- ANOREXIE
- SE CACHE EN PERMANENCE
- POSTURE DOS VOUSSÉ
- ABSENCE DE RÉACTION AUX STIMULI HABITUELS
- MANQUE DE MOBILITÉ
- HYPERAGRESSIVITÉ

→ BCP D'ABANDONS (PRISE DE CONSCIENCE IMPORTANTE)

RESSOURCES



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152318/

LE RAT

LE RAT

- RONGEUR
- CURIEUX, INTELLIGENT ET JOUEUR
- RAT DOMESTIQUE: *RATTUS NORVEGICUS*
- ACTIVITÉ CRÉPUSCULAIRE VOIRE NOCTURNE
- GRÉGAIRE
- BONNES CAPACITÉS D'APPRENTISSAGE
  - HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7G2RXTWU_FM

→ BON ANIMAL DE COMPAGNIE

- Généralités

LE RAT

- CONTENTION

- Généralités

LE RAT

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET DIPSIQUE

- ALIMENTATION
  - PERMANENTE NOCTURNE
  - DIURNE SI ANIMAL DOMESTIQUE
- RONGEUR OMNIVORE OPPORTUNISTE
- CONSOMMATION D'EAU: 30-40ML/JOUR

- Besoins éthologiques

LE RAT

- **COMPORTEMENT SOCIAL**

  - ANIMAUX GRÉGAIRE
  - HIÉRARCHIE DE DOMINANCE

- Besoins éthologiques

  - MALES ADULTES SOUVENT AGRESSIFS ENVERS NOUVEAU MALE
  - MUTUALGROOMING
  - COMBATS LUDIQUES (JEUNES)

LE RAT

- **COMPORTEMENT SOCIAL**
  - LE TICKLING
  - Besoins éthologiques

LE RAT

- **COMPORTEMENT EXPLORATOIRE**
  - DÉVELOPPÉ
  - DÉPLACEMENTS (GRIMPEUR) ET POSITION DEBOUT
  - DECHIQUETTER

- Besoins éthologiques

LE RAT

COMPORTEMENT REPRODUCTEUR

- PUBERTÉ : 5-6 SEMAINES
- MISE À LA REPRO DES FEMELLES: 4 MOIS
- GESTATION 21 À 23 JOURS
- PORTÉE DE 4 À 12 JEUNES
- SEVRAGE À 3-4 SEMAINES
- JEUNES NIDICOLES

- Besoins éthologiques

LE RAT

- **RONGEUR OMNIVORE OPPORTUNISTE**

→VARIÉTÉ DE SOURCES ALIMENTAIRES

- →CÉRÉALES
- →FRUITS
- →LÉGUMES
- →PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

- L'alimentation

Aliments concentrés extrudés

- (20-25g/jour)
- Eviter les mélanges de graines

Complémentation (fruits, légumes, œufs, viande, …)

QUESTION DE BIEN ÊTRE

- HÉBERGEMENT
  - MINIMUM UN CONGÉNÈRE, IDÉALEMENT EN TRIO
  - SURFACE DE 1M^2 POUR 3-4 INDIVIDUS SUR PLUSIEURS NIVEAUX
  - CACHETTES MULTIPLES
  - **MATÉRIEL DE NIDIFICATION**
  - ROUE (PLEINE)?
  - SORTIES RÉGULIÈRES
  - BAC À SABLE DE CHINCHILLA
  - TEMPÉRATURE IDÉALE: 20-24°C (26°C)
  - HUMIDITÉ RELATIVE: 40-60% (ACCEPTABLE 30-70%)
-

QUESTION DE BIEN ÊTRE

- ACTIVITÉS
  - BESOIN DE STIMULATIONS
  - BESOIN D’EXPLORER
  - BESOIN DE RONGER

ATTEINTES DE BIEN ÊTRE

- CHROMODACRYORRHÉE
  - PORPHYRINE
  - GLANDE DE HARDER
- PELAGE TERNE
- PAS OU PEU DE COMPORTEMENT EXPLORATOIRE
- ANIMAL PEU ACTIF
- SAUTS OU MOUVEMENTS DE DÉPLACEMENT RÉPÉTITIFS
- RONGE SES BARREAUX
- RÉACTIONS AGRESSIVES
- RING TAIL (HR BASE ET T° ÉLEVÉE)

THE RAT GRIMACE SCALE

https://www.nc3rs.org.uk/grimacescales

LE RAT

Ressources

https://www.ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Lignes_directrices_du_CCPA_sur_les_rats.pdf

LA SOURIS

- RONGEUR
- ENTRE 20 ET 40G
- ANIMAL NOCTURNE MAIS ADAPTATION EN CAPTIVITÉ
- TRÈS ACTIF
- PLUTÔT CRAINTIF
- CURIEUX, VIF ET JOUEUR
- ANIMAL GRÉGAIRE (CONTACTS SOCIAUX +++)
- LONGÉVITÉ: 1 À 2 ANS (MAX 3ANS)

- VUE FAIBLE
- ODORAT ET OUÏE +++
- TOILETTAGE IMPORTANT
- LUSTRAGE DU PELAGE DANS LA LITIÈRE
  - ÉTAT DU PELAGE = SIGNE DE BONNE SANTÉ

- PAS PAR LA QUEUE
  - JAMAIS À L'EXTRÉMITÉ
- PAR LE MATÉRIEL D'ENRICHISSEMENT
- TECHNIQUE DE LA « CUP »
- PLUS CONTRAIGNANTE: PEAU DU DOS

- **COMPORTEMENT EXPLORATOIRE**
  - TRÈS DÉVELOPPÉ
  - DÉPLACEMENTS +++
  - JOUEUR
  - GRIMPEUR
  - FOUISSEUR
  - JOUEUR
  - RONGEUR

- **COMPORTEMENT SOCIAL**
  - GRÉGAIRE
  - HIÉRARCHIE
  - MÂLE DOMINANT
  - TERRITORIAUX
  - BESOIN D ÉCHAPPATOIRE → COMBAT MORTEL

- **COMPORTEMENT REPRODUCTEUR**

  - MATURITÉ SEXUELLE
    - MÂLES: 2 MOIS
    - FEMELLES: 5-6 SEMAINES
  - GESTATION: 19-21 JOURS
  - PORTÉE MOYENNE: 7 À 12 JEUNES
  - MATÉRIEL DE NIDIFICATION IMPORTANT
  - LES JEUNES SONT NIDICOLES
  - SEVRAGE VERS 3-4 SEMAINES

LA SOURIS
ALIMENTATION

Rongeur omnivore

Consommation moyenne : 5g/jour

Aliments concentrés extrudés

Complémentation

- fruits, légumes, pain sec (en petite quantité), fruits secs, fromage, œufs …

Obésité

QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HEBERGEMENT
  - Minimum 2 individus (idéalement en trio)
  - Mâles souvent agressifs entre eux (territoriaux)

  - Plusieurs cachettes
  - Actif → roue pleine
  - Creuse tunnel, nid → litière épaisse (15cm min)
  - Matériel de nidification
  - Matériel à ronger





QUESTION DE BIEN-ÊTRE

- HEBERGEMENT
  - INTÉRÊT DU CHANGE PARTIEL DE CAGE

ATTEINTES DE BIEN-ÊTRE

- AGRESSIVITÉ +++ (MÂLES)
- MUTILATIONS (PLAIES)
- DÉPILATIONS
- SAUTS
- RONGE SES BARREAUX
- TOURNE EN ROND (ROUE OU PAS)
- HYPERACTIVITÉ
- « BARBERING »

STÉRÉOTYPIE SOURIS

SCORING DE CONSTRUCTION DU NID

https://www.ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Lignes_directrices_du_CCPA_sur_les_souris.pdf

LE HAMSTER

LE HAMSTER

- RONGEUR
- ANIMAL NOCTURNE, VIF, ACTIF
- **SOLITAIRE** ET **TERRITORIAL** (QQ EXCEPTIONS?)
- SOCIAUX POUR D'AUTRES…
- LONGÉVITÉ: 2 À 3 ANS
- POIDS
  - HAMSTER DORÉ : JUSQUE 250G (JUSQUE 45CM)
  - HAMSTER NAIN : 14 À 45G (10 À 15CM)

- PARTICULARITÉS ANATOMIQUES : ABAJOUES

- Généralités

LE HAMSTER

- ! Morsures !
- ! chute mortelle !

- Contention

LE HAMSTER

- **Comportement alimentaire**
  - Rongeur omnivore à tendance granivore
  - Opportuniste (insectes, escargots…)

  - Consommation moyenne: 6g d'aliment/100g de PC
  - Stockage +++

  - Consommation d'eau: 20-80mL/jour

- Besoins éthologiques

LE HAMSTER

- **Comportement exploratoire**
  - Rongeur
  - Creuse terriers avec galeries et chambres
  - Fouisseur (litière épaisse)
  - Crépusculaire et nocturne
- Besoins éthologiques

LE HAMSTER

- Besoins éthologiques
  - **Comportement Social**

Solitaire mais …

http://www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_compagnie/infothek/petits_animaux/zwerghamster.pdf

Espèce	Nom scientifique	Système social à l'état sauvage et composition du groupe en élevage	Composition du groupe adaptée en captivité pour éviter des naissances
Hamster doré	*Mesocricetus auratus*	Solitaire. Les couples se tolèrent uniquement pendant la période de fécondité de la femelle.	Détention individuelle, éventuellement couples mère-fille (mais ne fonctionne pas bien longtemps!).
Hamster de Chine	*Cricetulus griseus*	Solitaires et en couples, la femelle domine et harcèle beaucoup le mâle!	Détention individuelle. La détention en couple avec le mâle castré n'est possible que dans un enclos d'au moins 10 m², disposant d'un aménagement très diversifié et de plusieurs nids. Les mères et leurs petits de moins de 5 mois se tolèrent généralement.
Hamster russe	*Phodopus sungorus*	En couples	Couple de sexe mixte avec un mâle castré. Les groupes de mâles ont tendance à mieux se tolérer que les groupes de femelles, mais des bagarres peuvent éclater à tout moment.
Hamster de Campbell	*Phodopus campbelli*	En couples. Très sociable. Le mâle se préoccupe beaucoup de la femelle et de sa progéniture, il joue même le rôle de sage-femme!	Couple de sexe mixte avec le mâle castré. Les groupes de mâles ont tendance à mieux se tolérer que les groupes de femelles, mais des bagarres peuvent éclater à tout moment.
Hamster de Roborovski	*Phodopus roborowskii*	En familles	Couple mixte ou famille avec des mâles castrés. Les bagarres sont rares, même avec des groupes de même sexe.
Hamster souris	Différentes espèces: *Calomyscus sp.*	?	? (extrêmement rare en animalerie: hamster de Kashkaroff, *Calomyscus mystax*)

LE HAMSTER

- **Comportement reproducteur**

- PUBERTÉ
  - MALES: 45 – 60 JOURS (EXCEPTIONS D'ESPÈCES)
  - FEMELLES : 40-45 JOURS (EXCEPTIONS D'ESPÈCES)
- REPRO DÉPENDANTE DE LA PHOTOPÉRIODE
  - CONTINUE SI LONG CYCLE DE JOUR (14-16H)
- GESTATION: 16 À 25 JOURS
- TAILLE DE LA PORTÉE : 5 À 11 JEUNES (VARIABLE SELON LES ESPÈCES)
- JEUNES NIDICOLES
- SEVRAGE À 3-4 SEMAINES

- Besoins éthologiques

LE HAMSTER

- Alimentation

- **Rationnement**
  - Aliments extrudés
    - 4-8% de fibres
    - 15-17% de protéines
    - Max 4% de lipides
  - Tri +++ si mélanges de graines
  - ! Obésité !
  - Végétaux en compléments
    - Légumes: carottes, endives, concombre, brocolis…
    - Fruits: fraise, pomme, poire, banane, pêche…

QUESTION DE BIEN ÊTRE

- HEBERGEMENT
  - LOGEMENT SEUL (EXCEPTION DE L'HAMSTER RUSSE)
  - TAILLE VARIABLE SELON L'ESPÈCE
    - HAMSTER DORÉ: MIN 0,5 M^2
  - 30 CM DE HAUTEUR (SI PLUS → ÉTAGE PLEIN - ÉVITER CHUTE) (60CM POUR DORÉ)
  - ADORE GRIMPER ET CREUSER → LITIÈRE ÉPAISSE (MIN 15CM-IDÉAL: 40CM, VOIRE 80CM)
  - ABRI (MAISON, TUNNELS, …)
  - MATÉRIEL DE NIDIFICATION !

ATTEINTES DE BIEN-ÊTRE

- RESTENT CACHER EN PERMANENCE
- ANOREXIE
- HYPERACTIVITÉ
- RONGER SES BARREAUX
- MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS
- NETTOYAGE EXCESSIF
- MUTILATIONS
- AGRESSIVITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS…

Home | Animaux de compagnie | Animaux de rente | Animaux sauvages | Autres

You are here: protection-animaux.com » Publications » Animaux de compagnie » Feuilles d'information: Rongeurs | Lapins

Télécharger des feuilles d'information

Rongeurs, Lapins

- Lapin
- Cochons d'Inde - Cobayes
- Hamster doré de Syrie
- Hamsters nains - solitaires ou sociaux?
- Chinchilla
- Dègue du Chili
- Le rat
- Cricétome des savanes ou «rat de Gambie»
- Gerbilles de Mongolie
- Souris domestique

Brochures

Animaux de compagnie

Enclos adaptés

Feuilles d'information

Acheter un animal | Divers

Chats | Chiens

Rongeurs | Lapins

Reptiles

Oiseaux d'agrément

Aquarienfische

Élevage d'animaux de compagnie

Informations en langues étrangères

Rapports | Recherches

Rapports et recherches

FEUILLE D'INFORMATION PSA

ANIMAUX DE COMPAGNIE LAPIN

Lapin *ORYCTOLAGUS CUNICULUS*

Généralités

Origine et biologie: le lapin fait partie de la famille des léporidés et descend du lapin sauvage ou lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*), dont les origines sont à rechercher dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne.
Bien qu'ils rongent, les lapins ne sont pas des rongeurs. Si l'on compare le crâne d'un lapin avec celui d'un cochon d'Inde, on observera que le lapin possède de petites dents de soutien derrière les incisives; ces dents de soutien (incisives mineures) manquent chez les rongeurs. Il faut également distinguer entre le lièvre d'Europe (*Lepus europaeus*) et le lapin: les lièvres n'ont jamais été domestiqués et leur aspect, comme leur mode de vie, est différent de celui du lapin. Les lièvres sont plus grands et plus élancés. Ils ne creusent pas et n'aménagent pas de nid dans des cavités, puisque leurs petits naissent complètement développés après une longue gestation, contrairement aux lapereaux qui sont des nidicoles aveugles et vulnérables.
Tous les lapins domestiques actuels descendent du lapin sauvage, aucun ne descend du lièvre.
Espérance de vie: généralement 7 à 8 ans, 12 au maximum.
Maturité sexuelle: elle dépend fortement de la race et de l'alimentation. Généralement, l'animal y parvient à env. 8 à 10 semaines.
Période d'activité: dans la nature, les lapins sont surtout actifs au crépuscule et ils alternent des phases de repos de plusieurs heures aux phases d'activité.

Comportement et anatomie

Mode de vie naturel: dans la nature, les lapins sont très sociables et vivent dans des groupes familiaux et dans des colonies. Ils aménagent des systèmes de galeries souterraines dans lesquelles ils se retirent en cas de danger ou pour se reposer. Ces réseaux de galeries sont également utilisés pour l'élevage des petits. En dépit de l'intense sélection, nos lapins domestiques maintiennent les mêmes exigences sociales et le même mode de vie que leurs congénères sauvages!

1

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA LAPIN

Structure du groupe: les lapins sont des animaux sociaux et ne devraient jamais être détenus individuellement. Si l'on souhaite détenir deux lapins, on peut associer deux femelles, deux mâles castrés dans leur jeune âge ou une femelle et un mâle castré. En général, les couples de ce dernier genre et les mâles castrés se supportent mieux que deux femelles non stérilisées.
La détention d'un groupe permet d'envisager plusieurs combinaisons: un mâle castré avec une à trois femelles, deux mâles castrés avec deux à quatre femelles ou un groupe «purement masculin» composé de plusieurs mâles castrés prématurément, sans femelle.
Bien entendu, les sympathies et les antipathies existent aussi chez les lapins et il faut donc en tenir compte. De plus, il faut savoir que les lapins nains supportent moins la vie en groupe que les autres races, par exemple les Néo-Zélandais.
Les cochons d'Inde ne sont pas une compagnie idéale pour un lapin seul (de même que des lapins ne le sont pas pour un cochon d'Inde seul). Certes, on peut détenir 2 cochons d'Inde (au moins) et 2 lapins (au moins) dans le même groupe, mais il faut veiller à satisfaire les exigences des deux espèces, ce qui demande beaucoup de place.

http://www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_compagnie/mb_kleintiere.html

BIBLIOGRAPHIE

Harkness J.E., Wagner J.E. The biology and Medecine of rabbits and Rodents. 4th Ed. Williams x Wilkins, Media PA, 1995: 372 p.

Hillyer E., Quessenberry K. Ferrets, Rabbits and Rodents. W.B. Saunders Compagny, Philadelphie, 1997: 241-289

- Université de Montréal, centre hospitalier vétérinaire, fiches animaux exotiques disponibles sur https://chuv.umontreal.ca/le-chuv/hopital-des-animaux-de-compagnie/services-offerts-a-lhopital-des-animaux-de-compagnie/clinique-des-animaux-exotiques/

Protection suisse des animaux, fiches rongeurs et lapin disponibles sur http://www.protection-animaux.com/publications/index.html

EVALUATION PRATIQUE…